

WT Tutorium 2

Andreas Tsouchlos
21. November 2025




Bedingte Wahrscheinlichkeiten & Bayes

- Definition der bedingten Wahrscheinlichkeit

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$$

- Formel von Bayes


$$P(A|B) = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B)}$$



- Satz der totalen Wahrscheinlichkeit

Voraussetzungen: $\begin{cases} A_1, A_2, \dots \text{ disjunkt} \\ \sum_n A_n = \Omega \end{cases}$

$$P(B) = \sum_n P(B|A_n)P(A_n)$$



Bedingte Wahrscheinlichkeit

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$$

Formel von Bayes

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B)}$$

Satz der totalen Wahrscheinlichkeit

$$P(B) = \sum_n P(B|A_n)P(A_n)$$

Aufgabe 1: Bedingte Wahrscheinlichkeiten & Bayes

In einer Population von gelben Animationsfiguren, den Minions, werden zwei Merkmale unterschieden: Augenzahl und Körpergröße. Es gilt:

- 80% der Minions haben zwei Augen, 20% nur eines.
 - Von den zweiäugigen Minions sind 20% groß, 70% mittelgroß und 10% klein.
 - Von den einäugigen Minions sind 5% groß, 60% mittelgroß und 35% klein.
- a) Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass ein zufällig ausgewähltes Minion klein, mittelgroß oder groß ist.
- b) Ein zufällig ausgewähltes Minion ist nicht klein. Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist es einäugig?

Aufgabe 1: Bedingte Wahrscheinlichkeiten & Bayes

In einer Population von gelben Animationsfiguren, den Minions, werden zwei Merkmale unterschieden: Augenzahl und Körpergröße. Es gilt:

- 80% der Minions haben zwei Augen, 20% nur eines.
- Von den zweiäugigen Minions sind 20% groß, 70% mittelgroß und 10% klein.
- Von den einäugigen Minions sind 5% groß, 60% mittelgroß und 35% klein.

a) Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass ein zufällig ausgewähltes Minion klein, mittelgroß oder groß ist.

$$P(K) = P(K|N_1)P(N_1) + P(K|N_2)P(N_2) = 0,35 \cdot 0,2 + 0,1 \cdot 0,8 = 0,15$$

$$P(M) = P(M|N_1)P(N_1) + P(M|N_2)P(N_2) = \dots = 0,68$$

$$P(G) = P(G|N_1)P(N_1) + P(G|N_2)P(N_2) = \dots = 0,17$$

b) Ein zufällig ausgewähltes Minion ist nicht klein. Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist es einäugig?

$$P(N_1|\bar{K}) = \frac{P(\bar{K}|N_1)P(N_1)}{P(\bar{K})} = \frac{[1 - P(K|N_1)] P(N_1)}{1 - P(K)} = \frac{(1 - 0,35) \cdot 0,2}{1 - 0,15} \approx 0,153$$

- Erweiterte Definition der bedingten Wahrscheinlichkeit

$$P(A|BC) = \frac{P(AB|C)}{P(B|C)}$$

- Satz von Bayes mit zusätzlichen Bedingungen

$$P(A|BC) = \frac{P(B|AC)P(A|C)}{P(B|C)}$$

- Unabhängigkeit

$$A, B \text{ Unabhängig} \Leftrightarrow P(AB) = P(A)P(B) \Leftrightarrow P(A|B) = P(A)$$

Bedingte Wahrscheinlichkeit

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$$

Satz der totalen Wahrscheinlichkeit

$$P(B) = \sum_n P(B|A_n)P(A_n)$$

Formel von Bayes

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B)}$$

Unabhängigkeit von Ereignissen

$$P(AB) = P(A)P(B)$$

Aufgabe 2: Bayes & Unabhängigkeit

Bei einer Qualitätskontrolle können Werkstücke zwei Fehler aufweisen: Fehler A , Fehler B , oder beide Fehler gleichzeitig. Die folgenden Wahrscheinlichkeiten sind bekannt:

- mit Wahrscheinlichkeit 0,05 hat ein Werkstück den Fehler A
- mit Wahrscheinlichkeit 0,01 hat ein Werkstück beide Fehler
- mit Wahrscheinlichkeit 0,03 hat ein Werkstück nur den Fehler B und nicht Fehler A .

- Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten von Fehler B und dafür, dass ein Werkstück fehlerfrei ist.
- Ist das Auftreten von Fehler A unabhängig von Fehler B ?

Bei der Kontrolle wird unerwartet ein zusätzlicher, dritter Fehler C beobachtet. Der Fehler tritt mit der Wahrscheinlichkeit 0,01 ein, wenn weder Fehler A noch B eingetreten sind und mit der Wahrscheinlichkeit 0,02, wenn sowohl Fehler A als auch B eingetreten sind. In allen anderen Fällen tritt der Fehler C nicht auf.

- Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten von Fehler C .
- Sie beobachten, dass ein Werkstück den Fehler C hat. Mit welcher Wahrscheinlichkeit hat es auch Fehler A ?

Aufgabe 2: Bayes & Unabhängigkeit

Bei einer Qualitätskontrolle können Werkstücke zwei Fehler aufweisen: Fehler A , Fehler B , oder beide Fehler gleichzeitig. Die folgenden Wahrscheinlichkeiten sind bekannt:

- mit Wahrscheinlichkeit 0,05 hat ein Werkstück den Fehler A
- mit Wahrscheinlichkeit 0,01 hat ein Werkstück beide Fehler
- mit Wahrscheinlichkeit 0,03 hat ein Werkstück nur den Fehler B und nicht Fehler A .

a) Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten von Fehler B und dafür, dass ein Werkstück fehlerfrei ist.

$$P(B) = P(B|A)P(A) + P(B|\bar{A})P(\bar{A}) = P(AB) + P(\bar{A}B) = 0,01 + 0,03 = 0,04$$
$$P(\bar{A} \cap \bar{B}) = 1 - P(A \cup B) = 1 - [P(A) + P(B) - P(A \cap B)] = 1 - (0,05 + 0,04 - 0,01) = 0,92$$

b) Ist das Auftreten von Fehler A unabhängig von Fehler B ?

$$\left. \begin{array}{l} P(AB) = 0,01 \\ P(A)P(B) = 0,05 \cdot 0,04 = 0,002 \end{array} \right\} \Rightarrow P(AB) \neq P(A)P(B) \Rightarrow A, B \text{ nicht unabhängig}$$

Aufgabe 2: Bayes & Unabhängigkeit

Bei der Kontrolle wird unerwartet ein zusätzlicher, dritter Fehler C beobachtet. Der Fehler tritt mit der Wahrscheinlichkeit 0,01 ein, wenn weder Fehler A noch B eingetreten sind und mit der Wahrscheinlichkeit 0,02, wenn sowohl Fehler A als auch B eingetreten sind. In allen anderen Fällen tritt der Fehler C nicht auf.

c) Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten von Fehler C .

$$\begin{aligned} P(C) &= P(C|AB)P(AB) + \overbrace{P(C|\overline{A}\overline{B})}^0 P(\overline{A}\overline{B}) + \overbrace{P(C|A\overline{B})}^0 P(A\overline{B}) + P(C|\overline{A}B)P(\overline{A}B) \\ &= 0,02 \cdot 0,01 + 0,01 \cdot 0,92 = 0,0094 \end{aligned}$$

d) Sie beobachten, dass ein Werkstück den Fehler C hat. Mit welcher Wahrscheinlichkeit hat es auch Fehler A ?

$$P(A|C) = \frac{P(AC)}{P(C)}$$

$$\begin{aligned} P(AC) &= P(ACB) + P(AC\overline{B}) \\ &= P(C|AB)P(AB) + \overbrace{P(C|\overline{A}\overline{B})}^0 P(\overline{A}\overline{B}) \\ &= 0,02 \cdot 0,01 = 0,0002 \end{aligned}$$

$$P(A|C) = \frac{0,0002}{0,0094} \approx 0,0213$$

$$P(A|C) = \frac{P(C|A)P(A)}{P(C)}$$

$$\begin{aligned} P(C|A) &= P(C|AB)P(B|A) + \overbrace{P(C|\overline{A}\overline{B})}^0 P(\overline{A}\overline{B}) \\ &= P(C|AB) \frac{P(AB)}{P(A)} = 0,02 \cdot \frac{0,01}{0,05} = 0,004 \end{aligned}$$

$$P(A|C) = \frac{0,004 \cdot 0,05}{0,0094} \approx 0,0213$$